

c) Die Sekretion des Speichels und des Schleims erfolgt bei kleinen Dosen Pilocarpin viel schneller als die Sekretion des Magensafts.

d) Die Acidität des Magensaftes und die Verdauungskraft sind der Menge der Magensekretion proportional.

e) Pilocarpindosen setzen die Acidität und die Verdauungskraft des Magensaftes nicht herab.

Diatschenko. Ueber die Anwendung von Atropins bei Darmundurchgängigkeit. Bolnitschn. Gaseta Botkina. 1902. №№ 8 u. 9.

Der Gebrauch von Atropin bei Darmundurchgängigkeit erreicht seinen Zweck nur in seltenen Fällen, und ist bei incarcerirten Brüchen u. s. w. ohne Erfolg, wenn operative Hilfe geboten ist. Dieses Mittel ist bei Darmverstopfung, bei Gallen- und Nierengicht angezeigt.

Stawsky. Ueber die Atropinanwendung bei Darmundurchgängigkeit. Medizinsk. Obozrenie. 1903. S. 676.

Nachdem Verf. eine reichhaltige Literatur über diese Frage angeführt hat, beschreibt er seine eigenen Beobachtungen und erklärt, dass Atropin bei Darmundurchgängigkeit ein sehr gutes Mittel vorstelle, und in solchen Fällen angewandt werden solle, wo aus irgend einem Grunde zur Laparotomie nicht geschritten werden kann.

Artemoff. Ueber die Anwendung von Heroïnpräparaten in der psychiatrischen Praxis.

Heroïn sei bei Depressionszuständen ein gutes Mittel, welches auf die Intensität der Herzschläge beruhigend wirkt, auf den allgemeinen Gang der Krankheit aber keine Wirkung ausübt und den Gang der Krankheit nicht verkürzt.

Skorüchhoff. Ueber die Anwendung von Brucin in der Augenpraxis.

Inaug.-Dissert. S.-Petersburg. 1903.

Strychnin wird schon längst in der Augenpraxis angewandt, Brucin aber, welches weniger giftig als Strychnin ist, findet bisher nur wenig Anwendung in der Augentherapie. Nach den Angaben des Verfassers und vieler anderer Autoren, welche sich dieses Mittels bedient haben, verdient es ernste Berücksichtigung. Der Meinung des Verfassers nach könne Brucin als selbstständiges Mittel gegen Amblyopie, Ataxie nervösen Ursprungs, bei Neuritis retrobulbaris acut und chronic., bei einfacher und neuritischer, nichtprogressiver, Atrophie, bei Retinitis pigmentosa, bei Lähmungen und Paresen mit Erfolg angewandt werden. In jedem Falle habe Brucin einen Vorzug vor dem Strychnin: der Blutabfluss wird beschleunigt, die Gewebernahrung verbessert, die Resorption der verschiedenen pathologischen Produkte energischer. Als Contraindikation zum Brucingebrauche seien akute Entzündungszustände des Auges anzusehen.

Ladijensky. Heroïn und Kodeïn und deren pharmakologische vergleichende Wirkung auf den Tierorganismus. Inaug. Dissert. Dorpat. 1901.

Verfasser widmete seine Arbeit Versuchen über die pharmakodynamischen Eigenschaften des Kodeïns, um dessen Wirkung auf den allgemeinen Zustand der kalt- und warmblütigen Thiere zu erforschen und dessen Wirkung auf das Herz und das vasomotorische Centrum, auf die Gefäße und das Nerven-

system aufzuhellen. Die Resultate seiner Versuche an Fröschen, Kaninchen, Katzen und Hunden leiten den Verfasser zu folgenden Schlüssen. Auf Frösche wirkt Kodein in kleineren Dosen als Heroïn. Auf Warmblütler dagegen wirkt Heroïn in viel kleineren Dosen als Kodein. Die schlafferregende Wirkung minimaler Dosen von Heroïn auf Tiere ist stärker, als solche von Kodein. In dieser Beziehung steht das Heroïn dem Stammvater—dem Morphin—näher, als das Kodein. Die Letaldose des Heroïns ist für die Frösche und Kaninchen höher, als diejenige des Kodeïns. Die Wirkung des Heroïns auf Kaninchen ist ebenso stark bei der subkutanen Anwendung als beim innerlichen Gebrauche. Kodein aber wirkt bei subkutanen Injektionen auf Kaninchen viel stärker als bei innerlicher Darreichung. Die katalepsie- und krampferregende Wirkung des Heroïns ist stärker als die des Kodeïns. Heroïn vergrössert die reflektorische Erregbarkeit des Rückenmarks und setzt die Zahl und die Excursionen der Atembewegungen mehr als Kodein herab. Heroïn wirkt auf das Centrum der Atmung mehr depressorisch als Kodein. Die Temperatur fällt (bei Kaninchen) nach dem Gebrauche von Heroïn; nach dem Gebrauche von Kodein in denselben Dosen bleibt sie unverändert. Die Acetyl- und Methyl-derivate des Morphins wirken überhaupt auf das vasomotorische Centrum (Vasokonstriktoren) abschwächend und geben dadurch das Uebergewicht ihren Antagonisten (Vasodilatoren). Beim Heroïngebrauche ist auf die individuelle Idiosynkrasie mancher Patienten sowie auf die Gewöhnung an dieses Mittel Acht zu geben.

Dworetzky. Weitere Beobachtungen über die Wirkung des löslichen Silbers. Russk. Wratsch. 1903 №№ 4 u. 7.

Nachdem der Verfasser die Literatur der Frage angeführt hat, beschreibt er mehrere eigene Beobachtungen über die gute Wirkung des löslichen Silbers in verschiedenen chirurgischen Krankheiten; zum Beispiel in drei Fällen von akuter Phlegmone, in einem Falle von akuter Mastitis, in mehreren Fällen von Rotlauf führte Einreiben der Salbe Cr  d   die Heilung der Krankheit ohne chirurgische Hilfe herbei und verk  rzte die Krankheit wesentlich. Eine g  nstige Wirkung des Mittels wurde auch bei Furunculosis beobachtet.

Rubzoff. Ueber die aufl  senden Eigenschaften der Alkalien und anderer Mittel auf die Harnstoffs  ure. Inaug.-Diss. S.-Petersburg. 1901.

Verfasser studierte die Wirkung der unten genannten Mittel in dem pharmakologischen Laboratorium von Prof. Krawkoff an Tauben, welche er mit chromsaurem Kalium vergiftete, und gelangte zu folgenden Schl  ssen. 1) Ganz indifferent zeigten sich in gewissen Dosen: Urotropin, Uricidin, Acidum chinicum, nicht indifferent—Piperazin und Lysidin, unbedingt giftig—Lithium. 2) Die subkutane Injection aller dieser Mittel ruft eine sehr starke lokale Reaktion hervor. 3) Natrium und Lithium carbonicum und Urotropin sind unbedingt nicht imstande, unter dem Einfluss der Vergiftung mit chromsaurem Kali die Aufspeicherung von Harns  ure in den Geweben zu verhindern. 4) Uricidin und Acid. chinicum haben dieselbe Wirkung. Da sie aber die Harns  ure ausser dem Organismus nicht aufzul  sen verm  gen, so besteht ihre Wirkung haupts  chlich in der Herabsetzung der Harns  urebildung, und kann der Schluss   ber ihre Wirkung kein unbedingter sein. Es ist m  glich, dass sie unter anderen